Original

14.3.2020

ဒေါက်တာဝင်းသန်း
အပင်ရောဂါဗေဒနှင့်
သီးနှံကာကွယ်ရေးဦးစီး

166.1 mm | 4 mm | 178.1 mm | 4 mm | 7 mm

60.5 mm

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

ဤဆေးကို အသုံးမပြုမီ ဆေးအညွှန်းစာကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

သီးနှံ	ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်သောရောဂါများ	နှုန်းထား (စီစီ/ဧက)	နှုန်းထား(စီစီ/ရေ(၂၀)လီတာ)	ဆေးဖျန်းပြီးနောက် စိုက်သိမ်းရေးထွက်ရန် စောင့်ဆိုင်းရမည့်ရက်
ပြောင်း	ရွက်ဝိုးခြောက်၊ ပြောင်းရွက်ခြောက်	၂၀၀–၃၀၀	၃၀-၅၀	၁၄
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း	ရွက်ပြောက်	၂၄၀–၃၀၀	၄၀-၅၀	၁၄
နေကြာ	ရွက်ပြောက်၊ သံချေး	၂၄၀–၃၀၀	၄၀-၅၀	၁၄
ကော်ဖီ	သံချေး	၄၀၀–၅၀၀	၆၅-၈၅	၃၅
ငှက်ပျော	စီကာတိုကာ	၂၀၀–၃၀၀	၃၀-၅၀	၃၅
ပဲပုပ်	သံချေး၊ ရွက်ပြောက်	၂၄၀–၃၀၀	၄၀-၅၀	၁၄

တစ်ဧကလျှင် ရေ(၂၀)လီတာဝင် ဆေးဖျန်းပုံး (၆) ပုံးနှန်းဖြင့် တွက်ချက်ထားပါသည်။

- ဆေးဖျန်းပြီးနောက် စိုက်ခင်းပြန်ဝင်ရန် ဧကာင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ (၄၈) နာရီ။
- ရောဂါလက္ခဏာစတွေ့သည်နှင့် ဆေးဖျန်းပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများ ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက (၁၄)ရက်ခြား၍ တစ်ကြိမ် ဆက်၍ဖျန်းပါ။
- သီးနှံတစ်ရာသီအတွင်း အများဆုံး(၂)ကြိမ်ထက် ပိုမဖျန်းရန်။

Base
60.5 mm x 359.2 mm

ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

ပါဝင်သောပစ္စည်းများ

အစွမ်းရှိပစ္စည်းများ – Pyraclostrobin . . . 13.3%
Epoxiconazole . . . 5.0%
အစွမ်းမဲ့ပစ္စည်း 81.7%
စုစုပေါင်း 100%

250 cc

အဆိပ်ခြစ်မှုအဆင့်အတန်း – GHS အုပ်စု (၅)

ဓေါ်ပရာ

၁၈.၃% အက်စ်အီး

ကာကွယ်ကုသနိုင်သော မှိုသတ်ဆေး

OPERA 18.3% SE

(Pyraclostrobin 13.3% + Epoxiconazole 5% SE

BASF
We create chemistry

ထုတ်လုပ်သူ
BASF SE, Ludwigshafen, DE
Carl-Bosch-Str. 38
67056 Ludwigshafen, Germany

ဖြန့်ဖြူးသူ
JJ-PUN
JJ-PUN Trading Ltd.
အဆောက်အအုံ(၉)၊ ၅လွှာ၊ MICT Park (Phase-3)၊
လိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
ဖုန်း-၀၁-၂၃၅၁၃၃၅၊ ၂၃၀၅၁၃၃၆

မှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regd. No.)	P 2017-2768
ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ် (BN)	
ထုတ်လုပ်သည့်ရက်(DOM)	
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက် (Exp.)	

4 mm | 7 mm | 178.1 mm | 171.1 mm

60.5 mm

ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း

ဆေးကိုကိုင်တွယ်အသုံးပြုရာတွင် ဧရာ်ဘာလက်အိတ်၊ ဘွတ်ဖိနပ်၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လုံခြုံသောမျက်မှန်၊ ဦးခေါင်းကာ၊ လက်ရှည်အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီရှည်စသောအကာအကွယ် ပစ္စည်းများအသုံးပြုပါ။ ဆေးကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အစားအစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ လေကိုဆန့်၍ ဆေးကို မဖျန်းပါနှင့်၊ အသုံးပြုပြီးပါက အဝတ်အစားများကို ရွှတ်ပစ်ပြီး ဆပ်ပြာ၊ ရေတို့ဖြင့် သန့်စင်အောင် လျှော်ဖွတ်ပါ။ အစားအစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်မီ လက်ကိုဆပ်ပြာဖြင့် ဝင်ကြယ်အောင်ဆေးပါ။ဆေးဖျန်းပြီးအခင်းထဲသို့ကျွဲ၊နွားများမဝင်စေရန်၊ ဆေးအညွှန်းတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာအသုံးပြုပါ။

ဈေးဦးသူနာပြုစုနည်းများ

ဆေးထိသောအရေပြားကို ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့နှင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ မျက်စိထဲဝင်ပါက သန့်စင်သောရေဖြင့် (၁၅)မိနစ်ကြာအောင် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ ဆေးမှုန့်ရှူမိပါက အဆိပ်သင့်သူကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာသို့ ရွှေ့၍ပြီးသက်စွာထားပါ။ လိုအပ်ပါက ဈေးဦးသူနာပြုစုနည်းဖြင့် အသက်ရှူစေအောင် ပြုလုပ်ပါ။ မျိုချမိပါက ပါးစပ်ကို ဆေးကြောပြီး ရေတစ်ဖန်ခွက်ခန့်ကို တိုက်ပေးပါ။ အော့အန်အောင် မပြုလုပ်ရ၊ ဆရာဝန်ထံပြသ၍ ကုသမှုခံယူပါ။ ဆေးအဆိပ်သင့်လျှင် နီးစပ်ရာ ဆရာဝန်ထံသို့ လူနာအား အညွှန်းစာပါသော ဆေးဘူး/ဆေးထုပ်နှင့်အတူ တစ်ပါးတည်းခေါ်ဆောင်ပြီး ဆေးကုသမှု ခံယူပါ။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း

အေးချိန်ခြောက်သွေ့ကာ လေကောင်းလေသန့်ကောင်းစွာ ရရှိသောနေရာတွင် ဝိတ်ထားသော မူလဘူးပုံစံဖြင့် သိုလှောင်ပါ။ နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ကျရောက်သောနေရာတွင် တာရှည်မထားရ၊ လူအစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန်အစာများနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။ အသုံးမပြုပြီးသော ဆေးဘူး၊ ဆေးထုပ်ခွံများအားပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမပြုရ။ ပိုးမွှီ.ရ၊ ဗျက်ဆီးခ်ို၍ မမြေပြုပ်ပစ်ရပဉ်း ဆေးကြွင်းဆေးကျန်များ၊ ဘူးခွံများကို မြစ် ချောင်း အင်းအိုင်၊ ရေတွင်းရေကန်များ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စိုက်ခင်းများအနီးတွင် မဆေးကြောရ၊ မစွန့်ပစ်ရပါ။

ဖြေဆေး

အဆိပ်ဖြေဆေး သီးသန့်မရှိပါ။ အဆိပ်သင့် လက္ခဏာအရ ကုသပါ။

သတိပြုရန်

ရေနေသတ္တဝါများအား အလွန်အဆိပ်သင့်စေပြီး ရေပြင်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ရေရှည်တွင် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။
မမွေးဖွားသေးသော သန္ဓေသားကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ အသားအရေကိုလည်း ထိခိုက်လွယ်စေသည်။
အယ်ကာလီ ဂုဏ်သတ္တိ ၊ ကော့ပါးပါသောဆေးများနှင့် ရောနှော အသုံးမပြုရပါ။

Base
60.5 mm x 359.2 mm