

အခရိုဘက် အမ်ဇက်

(ကာကွယ်နိုင်သော ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိ မှီသတ်ဆေး)

Acrobat MZ

ပါဝင်သောပစ္စည်းများ	
အစွမ်းရှိပစ္စည်း - Dimethomorph	9%
Mancozeb	60%
အခြားပစ္စည်း	31%

မှီသတ်ဆေးကို အသုံးမပြုမီ ဆေးအညွှန်းစာကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

ရောဂါလက္ခဏာ စတွေ့သည်နှင့် ဆေးဖျန်းပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများ ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက (၇-၁၄)ရက် တစ်ကြိမ် ဆက်၍ဖျန်းပါ။ ထောက်ခံထားသော ဆေးနှုန်းထက် ပိုမို၍ မသုံးစွဲရ။ ပိုမိုထိရောက်စေရန်အတွက် ဆေးဖျော်ရည်ကို အရွက်များအား နှစ်ဖက်အောင် ပတ်ဖျန်းပါ။

သီးနှံ	ကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့်နိုင်သော ရောဂါများ	နှုန်းထား		ဆေးဖျန်းပြီးနောက် ရိုက်သိမ်းမှုဆုတ်ရန် စောင့်ဆိုင်းရမည့်ရက်
		(ဂရမ်/ဧက)	ဂရမ်/ ဧက ၂၀ လီတာ	
ခရမ်းချဉ်၊ အာလူး	နောင်းပင်နာကျရောဂါ	၆၀၀-၁၀၀၀	၁၀၀-၁၂၅	၁၄
သခွား	ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်ရောဂါ	၆၀၀-၁၀၀၀	၁၀၀-၁၂၅	၁၄
ကြက်သွန်	ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်ရောဂါ	၆၀၀-၁၀၀၀	၁၀၀-၁၂၅	၁၄
စပျစ်	ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်ရောဂါ	၆၀၀-၁၀၀၀	၁၀၀-၁၂၅	၁၄
ပဲပုပ်	ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်ရောဂါ	၆၀၀-၁၀၀၀	၁၀၀-၁၂၅	၁၄

- ဆေးဖျန်းပြီး ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ = အနည်းဆုံး (၂၄)နာရီ
- သီးနှံတစ်ရာသီအတွင်း အများဆုံးဖျန်းနိုင်သောကြိမ် - (၂ - ၃)ကြိမ်
- ဆေးဖျန်းခြားရက် - (၇ - ၁၄) ရက်

မှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regd. No.)..... **P 2017-514**.....
 ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ် (BN).....
 ထုတ်လုပ်သည့်ရက် (DOM).....
 သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက် (Exp.)

အဆိပ်ခြစ်မှုအဆင့်အတန်း - GHS အုပ်စု(၅)



1 Kg



အခရိုဘက် အမ်ဇက်

(ကာကွယ်နိုင်သော ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိ မှီသတ်ဆေး)

Acrobat MZ

ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း

ဆေးကို ကိုင်တွယ်သုံးစွဲရာတွင် လက်အိတ်၊ ဖိနပ်၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လက်ရှည်အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီရှည်၊ မျက်ကာမှန်၊ အနားကျယ်သော ဦးထုတ်စသော အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုပါ။ ဆေးကို ကိုင်တွယ် အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ လေကို ဆန်၍ ဆေးကို မဖျန်းပါနှင့်။ အသုံးပြုပြီးပါက အဝတ်အစားများကို ချွတ်ပစ်ပြီး ဆပ်ပြာ၊ ရေတို့ဖြင့် သန့်စင် အောင်လျှော်စွတ်ပါ။ အစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ် သောက်ခြင်း မပြုလုပ်မီ လက်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးပါ။ ဆေးဖျန်းပြီး အင်းထဲသို့ ကျွဲ၊ နွားများ မဝင်စေရ။ ဆေးဖျန်းစဉ် အသုံးပြုထားသော အကာအကွယ် ပစ္စည်းများကို လျှော်စွတ် နေလှန်းပြီးမှ ပြန်လည် အသုံးပြုပါ။

ရှေးဦးသူနာပြုရန်

ဆေးထိသော အရေပြားကို ရေဆပ်ပြာတို့နှင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ မျက်စိထဲဝင်ပါက ရေများများဖြင့် (၁၅)မိနစ်ကြာ ဆေးကြောပါ။ ဆေးဖျန်းရုံမိပါက လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် ငြိမ်သက်စွာ နေပါ။ လိုအပ်ပါက ရှေးဦးသူနာပြုရန်နှင့် အသက်ရှူစေအောင် ပြုလုပ်ပါ။ မျိုချမိပါက ခံတွင်းကို ဆေးကြောကာ ရေများများသောက်ပေးပါ။ အညွှန်းစာပါသော ဆေးဘူး၊ ဆေးထုပ်စွဲနှင့် အတူ နီးစပ်ရာ ဆရာပန်ထံ အမြန်ဆုံးပြသပြီး ကုသမှုခံယူပါ။
ဆေးကုသမှု
 ဖြေဆေးသီးသန့် မရှိပါ။ လူနာ၏ လက္ခဏာပေါ်မူတည်၍ ကုသရပါမည်။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း

အေး၍ ခြောက်သွေ့ကာ လေကောင်းလေသန့် ကောင်းစွာရရှိသောနေရာတွင် ပိတ်ထားသော မှလဘူး ပုံစံဖြင့် သိုလှောင်ပါ။ မီး နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ကျရောက်သောနေရာနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။ အသုံးပြု ပြီးသော ဆေးဘူးခွံများအား ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။ မီးမရှို့ရ။ ဖျက်ဆီး၍ မပြုလုပ်ရမည်။ အစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်သိုလှောင်ပါ။ ဆေးဘူး၊ ဆေးထုပ်အခွံများကို သောက်ရေ သုံးရေ အဖြစ် အသုံးပြုလျက်ရှိသော မြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင်များအနီးတွင် မသေကြော့ရှာ မစွန့်ပစ်ရ။

သတိပြုရန်

ရေနေသတ္တဝါများအား အလွန်အဆိပ်သင့်စေပြီး ရေပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ကြာရှည်တွင် ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ သန္ဓေသားကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများပါသည်။ အသား အရေကိုလည်း ယားယံစေသည်။ အလယ်ကာလီဂုတ်သတ္တိ၊ ကော့ပီးပါသောဆေးများနှင့် ရော၍ အသုံး မပြုရပါ။

ကလေးများ လက်လှမ်းမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

ထုတ်လုပ်သူ
BASF SE, Ludwigshafen, DE
 Carl-Bosch-Str. 38
 67056 Ludwigshafen, Germany

ဖြန့်ဖြူးသူ
JJ-PUN

ဈေးရယူမှု ထရေဆင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
 အထောက်အပံ့(၉)၊ ၅ လွှာ၊ MICT Park (Phase-3)
 လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
 ဖုန်း-၀၀ - ၂၀၅၀၃၅၅၊ ၂၀၅၀၃၀၆

