

# စတုန်း ဘီဘီ

## ကြွက်သတ်ဆေးခဲ

**STORM® BB**  
Rodenticide Wax Block Bait



Composition:  
Active Ingredient: **Flocoumafen** ..... 0.005% w/w Bait  
Inert Ingredient: ..... 99.995%  
Chemical Group- Coumarin  
**NET CONTENT: 1 Kg**



ကလေးများ လက်လှမ်းမီသောနေရာတွင်လုံခြုံစွာ သော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

**ကြွက်သတ်မြေခြင်း**

အဆိပ်ခဲ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုစဉ် အစာပစားရ၊ ရေပသောက်ရ၊ ဆေးလိပ်မသောက်ရ၊ ရော်ဘာလက်အိတ်စွပ်၍ ဆေးကို ကိုင်တွယ်ပါ။ အစားအစာ၊ သောက်သုံးရေများနှင့် ဝေးရာတွင် ထားပါ။ မူလဆေးထုပ်အတိုင်း လုံခြုံစွာ ပိတ်၍ လုံခြုံသောနေရာတွင် သော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။ အစားအစာများ၊ ဖိနပ်များ၊ ဝတ်စုံများ၊ အစားအစာ ချက်ပြုတ်ခြင်းဆိုင်သောနေရာများတွင် ဤအဆိပ်ခဲ မရေ၊ ဆောက်ရေ သုံးရေထဲသို့ မရောက်စေရ။ အဆိပ်ခဲ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲပြီးတိုင်း လက်ကိုဆေးကြောပါ။

**အဆိပ်ခဲသင့်လွှာကာ**

နာဆိပ်ခဲ သွားဖုတ်မှု၊ သွေးယိုစိပ်လာခြင်း အဆိပ်ခဲသင့်မှု ပြင်းထန်ပါက ဓမ္မာကိုယ်အတွင်းမှပါ သွေးများပြားစွာ ယိုထွက်လာနိုင်ပါသည်။

**ရူးဦးသူးနှာပြုစုခြင်း**

မျိုချစ်ပါက - ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။ ဆရာဝန် ချက်ချင်းပေးပို့နိုင်ပါက လူနာအား လည်ချောင်းအတွင်းသို့ လက်ချောင်းထိုးနိပ်၍ အနံ့အောင့်ပြုလုပ်ပါ။ လူအရေပြားနှင့်ထိပါက - ဆေးရုံခံယူပေးသောအခတ်အစားများကို ချွတ်ပြီး ဓရေဆပ်ပြာတို့ဖြင့် ဆေးကြောပါ။

မျက်စိအတွင်းဝင်ပါက - ရေများများဖြင့် မျက်စိကို ဆေးကြောပါ။

**ဆရာဝန်သို့အကြံပြုချက်**

အဆိပ်ခဲခြေဆေးမှာ **ပီတာပင်-ခက်** ဖြစ်သည်။ အဆိပ်ခဲသင့်မှု ပြင်းထန်ပါက **ပီတာပင်-ခက်** အကြောဆေးကို အကြိမ်ကြိမ်ခွဲ ထိုးပေးပါ။ လူကြီးအတွက် ၄၀ ပီလီဂရမ်နှင့် ကလေးများအတွက် ၂၀ ပီလီဂရမ် ခေ့စဉ်ထိုးပေးရမည်။

**အသုံးပြုပုံအညွှန်း**

အဆိပ်ခဲထားရန်နှင့် စစ်ဆေးခြင်း

သီးနှံစိုက်ခင်းကြွက်နှိမ်နှင်းရန်အတွက် -

- အဆိပ်ခဲချထားရမည့်နေရာ ရွေးချယ်ပါ။ (ဥပမာအားဖြင့် စိုက်ခင်း အစိုက်ပုံးဘေးပတ်ဝန်းကျင် ကြွက်တွင်၊ ကြွက်လှုပ်ရှားသွားလာလမ်းကြောင်း၊ ကြွက်များ နေထိုင်သောနေရာနှင့် အစာရှာဖွေရာ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် အဆိပ်ခဲချထားရမည်။
- ကြွက်ဦးရေများပြားပါက (၁၅-၃၀) ပေဖြား ချထားပေးပါ။ ထိပ်နှစ်ခက် ဖွင့်ထားသော ပလပ်စတစ်ပိုက်(သို့မဟုတ်)ရေသန့်ဘူးခွံအတွင်း၌ မြှားစာချခြင်းဖြင့် မိုမိုထိရောက်နိုင်ပါသည်။

အဆိပ်ခဲကြွက်နှိမ်နှင်းရန်အတွက် -

- ကြွက်လှုပ်ရှားသွားလာမှုထင်ရှားသောနေရာ၊ ကြွက်ချေးများ တွေ့ရသောနေရာများတွင် ဤအဆိပ်ခဲချပေးပါ။ (၇)ရက်အတွင်း အဆိပ်ခဲချထားသောနေရာကို စစ်ဆေးပြီး ကြွက်စားထားသည့် အဆိပ်ခဲအကြွင်းအကျန်များကို အဆိပ်ခဲအသစ်ဖြင့် လဲလှယ်ပေးရမည်။ ထို့ပြင် ကြွက်စားထားသည့်လူကွကာ မတွေ့ရသော အဆိပ်ခဲများကို နေရာပြောင်း၍ ချထားပေးရမည်။ ကြွက်တွင်းဝနှင့် အဆိပ်ခဲချထားသောနေရာများကို (၇)ရက်ကြား စစ်ဆေးပြီး ကြွက်များ အဆိပ်ခဲစားထားကြောင်းတွေ့ပါက အဆိပ်ခဲအသစ် ထပ်မံချထားရမည်။

**သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း**

ဆေးထုပ်ကို သေချာစွာပြန်ပိတ်၍ အစားအစာများ တိရစ္ဆာန်အစာများနှင့် ဆေးကြွင်းဆေးဆဲနှင့် ကြွက်သေများကို သေချာစွာအမြဲပြုစုစွန့်ပစ်ပါ။ အထုပ်ခွံများကို ပြန်မသုံးရ။

အဆိပ်ခြစ်မှုဆိုင်အတန်း- GH5 အုပ်စု (၅)

**ဤအသုံးမပြုမီ ဆေးအညွှန်းစာကို သေချာစွာခတ်ပါ။**

**အသုံးပြုရန်အညွှန်း**

| သီးနှံ                                   | နှုန်းထား                        | အသုံးပြုရမည့် အကြိမ် |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| ပဲ၊ ကြက်ကိုကိုး၊ ငှက်ပျော၊ စိုက်ခင်းများ | ၂၀၀-၃၀၀ ဂရမ်/ဧက (ဆေးခဲ ၄၀-၆၀/ဧက) | ၂ - ၄ ကြိမ်          |

ထုတ်လုပ်သူ  
**BASF SE, Ludwigshafen, DE**  
Carl-Bosch-Str. 38  
67056 Ludwigshafen, Germany

**ပြန်ကြေး**

**GOLDEN LION HIGH TECH AGRICULTURAL CO., LTD.**  
အမှတ် - ၂၄၂ ကမ္ဘောဇမင်းသာကြီးလမ်း၊ လှိုင်သာယာဝက်မှု(၂)၊ ရန်ကင်းမြို့၊ မြန်မာ၊ ဖုန်း - +၈၅-၀-၆၉၄၅၀၁၆၉၀၀၃၀၆၉၂၀၆

မှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regd. No.) **P 2017-2769**.....  
ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ် (BN) .....  
ထုတ်လုပ်သည့်ရက် (DOM) .....  
သက်တမ်းကုန်ထုတ်ရက် (Exp.) .....



*Handwritten signature and date: 14.6.2018*

သင်းသင်းမြင့်  
ကံထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး  
သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ