

**ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။**

**ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း**

ဆေးဖျန်းရန်အတွင်း အကာအကွယ်အဝတ်အစားများ၊ လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ မျက်နှာဖုံးများဝတ်ဆင်ပါ။ ဆေးဖျန်းရန်နှင့် ဆေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုရန်အတွင်း အစာမစား၊ ရေမသောက်၊ ဆေးလိပ်မသောက်၊ လေကိုဆန်၍ ဆေးမဖျန်းရ။ ဆေးဖျန်းပြီးပါက အကာအကွယ်အဝတ်အစားများကို ခွတ်ပြီး ဆပ်ပြာ၊ ရေတို့ဖြင့် လျှော်ဖွတ်ပါ။ အစာမစားမီ၊ ရေမသောက်မီ၊ ဆေးလိပ်မသောက်မီ လက်ကို သေချာစွာ ဆေးကြောပါ။ ဆေးဖျန်းပြီး အခင်းထဲသို့ ကျွဲ၊ နွားစသည့်တိရစ္ဆာန်များ မဝင်ရောက်စေရ။

**ရှေးဦးသူနာပြုခြင်း**

အရေပြားကို ဆေးထိမိပါက ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ မျက်စိအတွင်း ဝင်ရောက်ပါက (၁၅)မိနစ်ခန့်ကြာအောင် ရေများဖြင့် ချက်ချင်းဆေးပါ။ ဆေးဖျန်းမှုရှိပါက အဆိပ်သင့်လူနာကို လေကောင်းလေသန့်ရသောနေရာသို့ရွှေ့၍ အနားယူပါစေ။ လိုအပ်ပါက လူနာအသက်ရှူနိုင်အောင် ကူညီပေးပါ။ ဆေးမျိုချိမိပါက လူနာသတိရနေသေးလျှင် ပလုပ် ချက်ချင်းကျင်းပြီး ရေ(၃၀၀)မီလီလီတာခန့် သောက်ပါစေ။ ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။

**ဆေးကုသခြင်း**

လူနာ၏လက္ခဏာအရ ဆေးကုသမှုခံယူပါ။

**သို့လှောင်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း**

အေး၍ခြောက်သွေ့ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် မူလအဖုံးပိတ်ထားသည့်အတိုင်း သို့လှောင်ပါ။ နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်မထိစေရ။ အပူချိန် ၄၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်၍ မသိမ်းရ။ ဆေးဘူးခွံများကို ပြန်မသုံးရ။ ဆေးဘူးခွံများကို ဖျက်ဆီး၍ မြေမြှုပ်ပါ။ လူအစားအစာနှင့် တိရစ္ဆာန်စာများမှ ဝေးအောင်စွန့်ပစ်ပါ။ အင်းအိုင်၊ ချောင်းမြောင်းများအတွင်း မစွန့်ပစ်ရ။ မီးမရှို့ရ။

**သတိပြုရန်**

ပျားများနှင့် ပုရွက်ကဲ့သို့သော ရေနေကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများကို အဆိပ်သင့်စေသည်။ ပျားများကို ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ပန်းပွင့်စိ အနည်းငယ်ဆုံး (၁၄)ရက်နှင့်ပန်းပွင့်ချိန်အတောအတွင်း ဤဆေးအသုံးပြုမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ အနီးအနားရှိစပါးခင်း (သို့မဟုတ်) ပန်းပွင့်နေသောအပင်များကို ဆေးဖျန်းမထိအောင်ရှောင်ပါ။ (ဥပမာ- ဆေးဖျန်းလွင်ခြင်း)။ ဆေးဖျန်းတိုက်ရိုက်ထိထားသော ကောက်ရိုးများကို တိရစ္ဆာန်များအား မကျွေးရ။ ငါး၊ ပုရွက် စသည့်မွေးမြူရေးကန်များအနီးတွင် မသုံးရ။ - ဆေးထိမိလျှင် အရေပြားယားယံခြင်းနှင့် မျိုချိမိပါက အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။

မှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regd. No.) ..... F 2016 - 357 .....  
 ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ် (BN) .....  
 ထုတ်လုပ်သည့်ရက် (DOM) .....  
 သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက် (Exp.) .....

# အက်ဆန် ၅၀ အက်စ်စီ

ထိသေစားသေပင်လုံးပြန်ပိုးသတ်ဆေး (ဆိုင်းတွဲဆေးရည်ပြင်း)

## ASCEND 50 SC Fipronil 5 % SC

ဆေးအုပ်စု - Phenylpyrazole

ပါဝင်သောပစ္စည်းများ  
 အစွမ်းရှိပစ္စည်း - Fipronil ..... ၅%  
 အစွမ်းမဲ့ပစ္စည်း ..... ၉၅%  
 စုစုပေါင်း ..... ၁၀၀%

**1 Litre**

ထုတ်လုပ်သူ  
**BASF SE, Ludwigshafen, DE**  
**Carl-Bosch-Str. 38**  
**67056 Ludwigshafen, Germany**

ဖြန့်ဖြူးသူ  
**GOLDEN LION HIGH TECH**  
**AGRICULTURAL CO., LTD.**  
 အမှတ် - ၂၄၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်(၂)၊  
 ရန်ကင်းမြို့၊ မြန်မာ၊ ဖုန်း - + ၉၅-၁-၆၈၄၄၅၀၊ ၆၈၄၀၃၃၊ ၆၈၂၆၀၆



အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင်အတန်း - GHS အုပ်စု (၃)

**ထုတ်ကုန်ကို အသုံးမပြုမီ လက်ကမ်းစာစောင်ကိုဖတ်ပါ။**

**သုံးစွဲရန်အညွှန်း**

သီးနှံ	ဖျက်ပိုး	နှုန်းထား (စီစီ/ဧက)	စီစီ/ရေ (၂၀) လီတာ	သီးနှံပူးထွက်ပြီး စောင့်ဆိုင်းမည့်ကာလ (နံ)
စပါး (တိုက်ရိုက်အစေ့ချစပါးနှင့် ပျိုးထောင်စိုက်စပါး)	ဆစ်ပိုး	၂၀၂	၃၅	၅၀
စပါး (တိုက်ရိုက်အစေ့ချစပါး)	လှေပိုး	၂၀၂	၃၅	၅၀
အာလူး	ရွက်ထွင်းပိုး	၈၀ - ၂၄၀	၁၅ - ၄၀	၁၄
ကြက်သွန်နီ	ရွက်ထွင်းပိုး	၁၆၀ - ၃၂၀	၃၀ - ၅၅	၁၄

- ပျိုးထောင်စိုက် စပါးသီးနှံတွင် ပင်ပွားအများဆုံးထွက်ချိန်၌ ပိုးကောင်ကြီးများကို တွေ့စဉ် တစ်ကြိမ်နှင့် ခေါင်နှံမထွက်မီ (၁၄) ရက်အလိုတွင် တစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း နှစ်ကြိမ် ဖျန်းပါ။ ဆေးဖျန်းခြားရက်(၁၄)ရက်။
- တိုက်ရိုက်အစေ့ချ စပါးသီးနှံတွင် ပျိုးစေ့ပေါက်ပြီး (၇) ရက်အကြာ စပါးပင်အရွက် (၃ - ၄) ရွက်ထွက်ချိန်၌ တစ်ကြိမ်ဖျန်းပါ။ ဆေးဖျန်းခြားရက်(၁၄)ရက်။
- အာလူး နှင့် ကြက်သွန်နီ သီးနှံများတွင် ဖျက်ပိုးတွေ့ ချိန်အသုံးပြုရန်နှင့် အများဆုံး (၃) ကြိမ် အသုံးပြုပါ။ ဆေးဖျန်းခြားရက်(၁၀)ရက်။

ဆေးဖျန်းပြီးနောက် စိုက်ခင်းအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်ချိန်  
 - ဆေးဖျန်းပြီး ဝင်ရောက်နိုင်သောအချိန် - (၂၄) နာရီအကြာ။

