

မိုရမ် ၅၀ ဒဗလျူပီ

ကကွယ်နိုင်သော မှိုသတ်ဆေး

Forum® 50 WP Systemic fungicide

ပါဝင်သောပစ္စည်းများ

အရွှမ်းရိပ်ပစ္စည်း - Dimethomorph 50%

အရွှမ်းမဲ့ပစ္စည်း - 50%

ထုတ်လုပ်သူ

BASF SE, Ludwigshafen, DE
Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany

ခြံမြေသူ



AKA YARZAR COMPANY LIMITED
No.267, Shwe Maw Daw Pagoda Road, Yonegyi Quarter,
Bago, Myanmar Ph: 959 455557861, 959 455557862,
959 455557863, 959 455557864 Email: akayarzaragro@gmail.com

500 g



အဆိပ်ခြံမြေမှုအဆင့်အတန်း - GHS အုပ်စု(၅)



ကလေးများ လက်လှမ်းမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

မှိုသတ်ဆေးကို အသုံးမပြုမီ ဆေးအညွှန်းစာကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နှင်းနိုင်သောရောဂါများ	နှုန်းထား		ဆေးချိမ်းပြီးနောက် ရိုက်သိမ်းမှုဆောင်ရွက်ရန် စောင့်ဆိုင်းရမည့်ရက်
		ဂရမ်/ဧက	ဂရမ်/ ဧလျာလီတာ	
အာလူး ခရမ်းချဉ်	နှောင်ပင်နာကျ(လောင်းပိ)ရောဂါ	၁၂၀-၂၄၀	၂၄-၄၈	၁၄
ပပုစွန်၊ ဓမ္မိ၊ သဘွား သဘွားအမွှား ကြက်သွန်နီ/ဖြူ	ဆိုင်နီရွက်ခြောက်ရောဂါ	၁၂၀-၁၄၀	၂၄-၄၈	၁၄
ကွမ်းရွက်၊ ရေတံကောင်း ဖူးရင်း၊ လီမ္ပေ	အရွက်ပုပ်၊ အခေါက်ပုပ်၊ ပင်စည်ပုပ်၊ ကိုင်းပုပ်ရောဂါ	၁၂၀-၁၄၀	၂၄-၄၈	၁၄
ငရက်	အသီးပုပ်၊ ပင်နာကျရောဂါ	၁၂၀-၁၄၀	၂၄-၄၈	၁၄
ဆေးရွက်ကြီး	ပင်ခြေပုပ်၊ မှိုကြောရောဂါ	၁၂၀-၁၄၀	၂၄-၄၈	၁၄
နာနာ	ခေါင်းပုပ်၊ အမြစ်ပုပ်	၁၂၀-၁၄၀	၂၄-၄၈	၁၄

- ရောဂါလက္ခဏာတွေ့သည့်နေ့နှင့် ဆေးချိမ်းမီ ရောဂါလက္ခဏာများ ထက်လက်ရှိနေသေးပါက (၁၀-၁၄)ရက်ကြာ (၁)ကြိမ် ထက်လက်ချိမ်းပါ။
- သီးနှံတစ်ရာသီအတွင်း အများဆုံး (၃)ကြိမ်ထက် ပိုမချိမ်းရ။
- ဆေးချိမ်းပြီးရိုက်သိမ်းအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောအချိန် - အနည်းဆုံး (၂၄)နာရီ

ပြန့်နှံ့ပျံ့နှံ့ခြင်း
ဆေးချိမ်းစဉ်လက်အိတ်၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လည်ရည်စိမ်း၊ ဘောင်းဘီရည်၊ ရှပ်အင်္ကျီလက်ရည်၊ ဖျက်မှုန့်၊ ဦးထုပ်သည် အကာအကွယ်ပတ်စုံများ အပြည့်အစုံဝတ်ဆင်ပါ။ မျက်လုံးနှင့် အပြောအပေါ်သို့ဆေးနှင့် တိုက်ရိုက်မထိစေရ။ ဆေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေချိန် အစာစားခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း မပြုရ။ ဆေးချိမ်းပြီးလျှင် အဝတ်အစားများကို ဆင်ခြာနှင့် ဂရုတစိုက် စင်ကြယ်အောင်လေ့ရှိရမည်။ ဆေးချိမ်းစဉ် လေဆန်မှ မချိမ်းရ။

အသုံးပြုခြင်း
ဆေးချိမ်းရန်မီကာ လူနာကို လေကောင်းလေသန့်ရရှိသည့်နေရာသို့ ရွေ့ပြောင်းထားပါ။ အပြောအပေါ်သို့ ဆေးရည်မိကျင့် ရှိမှ ဆင်ခြာတို့နှင့် ရှက်ချင်းဆေးပေးပါ။ မျက်စိထိဝင်ပါက ရေများများနှင့် (၁၅)မိနစ်ကြာမျှ ဆေးပေးပါ။ ဆေးထိုးချိန်ကာလ ရေနှင့်ပလွန်ကျင်းပါ။ ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ အန်ဆေးမပြုလုပ်ရ။ လူနာကို ဆေးထုပ်ပါ ပိုသတ်ဆေးအညွှန်းစာနှင့်အတူ ထရာဝန်နှင့် အမြန်ကုသပါ။

ဆရာဝန်သို့ အကြံပြုချက်
တိကျသောအဆိပ်ခြေဆေး မရှိပါ။ အဆိပ်သင့်လက္ခဏာကို ကြည့်၍ ကုသပေးပါ။
သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း
ဆေးအိတ်ကိုပိတ်၍ ဆေးခြေမြှောက်သောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းသိုလှောင်ပါ။ လူနှင့်တိရစ္ဆာန် အစာအစားများ မီလောင်လှယ်သောနေရာများနှင့် ဝေးရာတွင် သော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။ ဆေးကြွင်းဆေးကျန်နှင့် အိတ်နံ့များကို မြမ်း၊ ချောင်း၊ အင်းတိုင်း ရေတွင်ရေကန်များတွင် မထေးကြော့မှု မစွန့်ပစ်ရ။ ထုထည်များကို သိုလှောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်၍ ဖြောင့်တင်မှုကို တွယ်၍ ဖြောင့်တင်ပါ။ အိတ်စွဲအလွတ်များကို ပြန်မသုံးရ။ မီးမရှိရ။

မှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regd. No.) **F2018-475**

ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ် (BN)

ထုတ်လုပ်သည့်ရက် (DOM)

သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် (Exp.)

အဆိပ်ခြံမြေမှုအဆင့်အတန်း - GHS အုပ်စု(၅)

