

ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း

ဆေးကို ကိုင်တွယ်သုံးစွဲရာတွင် လက်အိတ်၊ ဖိနပ်၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လက်ရှည်အင်္ကျီစသော အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုပါ။ ဆေးကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အစားအစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ လေကိုဆန်၍ ဆေးကိုမဖျန်းပါနှင့်။ အသုံးပြုပြီးပါက အဝတ်အစားများကို ချွတ်ပစ်ပြီး ဆပ်ပြာ၊ ရေတိုဖြင့် သန့်စင်အောင် လျှော်ဖွတ်ပါ။ အစားအစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း မပြုလုပ်မီ လက်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးပါ။ ဆေးဖျန်းပြီး အခင်းထဲသို့ ကျွဲ၊ နွားများ မဝင်စေရ။

ရှေးဦးသူနာပြုရန်များ

ဆေးထိသော အရေပြားကို ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့နှင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ မျက်စိထဲဝင်ပါက ရေများဖြင့် (၁၅) မိနစ်ကြာ ဆေးကြောပါ။ ဆေးမှန်ရှူမိပါက လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် ငြိမ်သက်စွာနေပါ။ လိုအပ်ပါက ရှေးဦးသူနာပြုရန်များဖြင့် အသက်ရှူစေအောင် ပြုလုပ်ပါ။ ဖျိုချမိပါက ခံတွင်းကို ဆေးကြောကာ ရေများဖြင့် သောက်ပေးပါ။ နီးစပ်ရာ ဆရာဝန်ထံ အမြန်ဆုံးပြသပြီး ကုသမှုခံယူပါ။ ဆေးကုသမှု - လူနာ၏ လက္ခဏာပေါ်မူတည်၍ ကုသရပါမည်။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း

အေး၍မြှောက်သွေ့ကာ လေကောင်းလေသန့်ကောင်းစွာရရှိသောနေရာတွင် ပိတ်ထားသော မူလဘူးပုံစံဖြင့် သိုလှောင်ပါ။ မီး၊ နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ကျရောက်သောနေရာနှင့် ဝေးရာတွင် ထားပါ။ အသုံးပြုပြီးသော ဆေးဘူးများအား ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။ ဖျက်ဆီး၍ မြေမြှုပ်ပစ်ရမည်။ အစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန်စာများနှင့် ဝေးရာတွင် သိုလှောင်ပါ။

သတိပြုရန်

- ပုစွန်ကိုသို့သောရေနေသတ္တဝါများကို အဆိပ်သင့်စေပါသည်။ ငါး၊ ပုစွန်နှင့် ဂဏန်းမွေးမြူထားသော ကန်၊ ရေငါး၊ အင်းအိုင်များနှင့် နီးစပ်သောရေပြင်များနှင့် စပါးခင်းများတွင် ဆေးဖျန်းခြင်းမပြုလုပ်ရ။
- ဆေးဖျန်းပြီး (၁၂) နာရီအတွင်း စိုက်ခင်းထဲ ပြန်မဝင်ရ။

ပါလစ်

၁၀ အက်စ်မီ

PALIT® 10 SC
Chlorfenapyr 10% SC
ဆေးအုပ်စု - Pyrazole

မိလင်သောပစ္စည်းများ
 အစွမ်းရှိပစ္စည်း - Chlorfenapyr _____ ၁၀%
 အစွမ်းမဲ့ပစ္စည်း _____ ၉၀%
 စုစုပေါင်း _____ ၁၀၀%

250 cc

ထုတ်လုပ်သူ
BASF South East Asia Pte Ltd.
 7 Temasek Boulevard,
 #35-01 Suntec Tower One,
 038987 Singapore

ဖြန့်ဖြူးသူ
AVENTINE LIMITED.
 No.9 (C1), Yaw Minn Gyi Quarter,
 Dagon Township, Yangon, Myanmar



ဝိုးသတ်ဆေးကို အသုံးမပြုမီ ဆေးအညွှန်းစာကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

ထိသေစားသေအာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေး



သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဖျက်ပိုး	နှုန်းထား (စီမီ/ဧက)
ဂေါ်ဖီထုပ်	စိန်ကွက်ဖလံ	၄၀၀ - ၅၀၀
ကိုက်လန်	ပင်ဖြတ်ပိုး၊ ငမြောင်တောင်	၂၀၀ - ၄၀၀
ဥစားကြက်သွန်	ပင်ဖြတ်ပိုး	၄၀၀ - ၆၀၀
ငရုတ်၊ ကြက်သွန်	လှေးပိုး	၄၀၀ - ၅၀၀

- ဆေးဖျန်းပြီးစောင့်ရမည့်ရက် - ၇ ရက်
- သီးနှံတစ်ရာသီအတွင်း အများဆုံး (၃)ကြိမ်ထက် ပိုမဖျန်းရ။
- မှတ်ချက် - ဝိုးကျရောက်မှု ဆိုးရွားပါက ၅ရက်ခြား တစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) နှစ်ကြိမ်ဖျန်းပါ။

မှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regd. No.) **F 2016-520**
 ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ် (BN)
 ထုတ်လုပ်သည့်ရက် (DOM)
 သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက် (Exp.)



အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း: GHS အုပ်စု - (၄)