

# ပေါ်လီရမ်

**Polyram® 70% DF**

**၇၀% ဒီအက်စ်**  
(ကာကွယ်ကုသနိုင်သော မှိုသတ်ဆေး)

**ဤထင်ကာကွယ်ခြင်း**

ဆေးကို ကိုင်တွယ်သုံးစွဲရာတွင် လက်အိတ်၊ ဖိနပ်၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လက်ရှည်အင်္ကျီစသော အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုပါ။

ဆေးကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အစားအစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေး လိပ်သောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။

လေကိုဆန်၍ ဆေးကိုမထွန်းပါနှင့်။ အသုံးပြုပြီးပါက အဝတ်အစားများကို ခွက်ပစ်ပြီး ဆပ်ပြာ၊ ရေတို့ဖြင့် သန့်စင်အောင် လျှော်ဖွတ်ပါ။

အစားအစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေး လိပ်သောက်ခြင်း မပြုလုပ်မီ လက်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးပါ။

ဆေးဖျန်းပြီး အစင်းထဲသို့ ကျွဲ၊ နွားများ မဝင်စေရ။

**ရေဦးသူနာပြုရန်များ**

ဆေးထိသောအရေပြားကို ရေ ဆပ်ပြာတို့နှင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ မျက်စိထိဝင်ပါက ရေများဖြင့် (၁၅)မိနစ်ကြာဆေးကြောပါ။ ဆေးမှုန့်ရှူမိပါက လေဝင်လေထွက်ကောင်း

သောနေရာတွင် ငြိမ်သက်စွာနေပါ။ လိုအပ်ပါက ရေဦးသူနာပြုရန်များဖြင့် အသက်ရှူစေအောင် ပြုလုပ်ပါ။

မျိုးချမ်းပါက ခံတွင်းကိုဆေးကြောကာ ရေများများ သောက်ပေးပါ။ နီးစပ်ရာ ဆရာဝန်ထံ အမြန်ဆုံးပြသပြီး ကုသမှုခံယူပါ။

ဆေးကုသမှု လူနာ၏ လက္ခဏာပေါ်တည်၍ ကုသရပါမည်။

**သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း**

အေး၍ခြောက်သွေ့ကာ လေကောင်းလေသန့်ကောင်းစွာရရှိသောနေရာတွင် ပိတ်ထားသော မူလဘူးပုံစံဖြင့် သိုလှောင်ပါ။ မီး၊ နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ကျရောက်သောနေရာနှင့် ဝေးရာတွင် ထားပါ။ အသုံးပြုပြီးသော ဆေးဘူးခွံများ အား ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။ ဖျက်ဆီး၍ မြေမြှုပ်ပစ်ရမည်။ အစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန်စာများနှင့် ဝေးရာတွင် သိုလှောင်ပါ။

**သတိပြုရန်**

ထုံး (သို့) ဆီပါဝင်သော ဆေးများနှင့် ရောစပ်သုံးစွဲခြင်း မပြုရပါ။

ကာလေးများ လက်လှမ်းမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသေတ္တာဖော်သိမ်းဆည်းပါ။

ထုတ်လုပ်သူ  
**BASF SE, Ludwigshafen, DE**  
Carl-Bosch-Str. 38  
67056 Ludwigshafen, Germany

မြန်မာပြည်သူ  
**GOLDEN LION HIGH TECH AGRICULTURAL CO., LTD.**  
အမှတ် - ၂၄၂ ကနောင်မင်းဘားကြီးလမ်း  
လှိုင်သာယာစက်မှု(၂)၊ ရန်ကင်းမြို့၊ မြန်မာ  
စုန်း - +၉၅ - ၀ - ၆၈၃၄၅၀၊ ၆၈၃၀၀၃၊  
၆၈၂၆၀၆

*(Handwritten signature and date)*  
18/7/16

# ပေါ်လီရမ်

**Polyram® 70% DF**

**၇၀% ဒီအက်စ်**  
(ကာကွယ်ကုသနိုင်သော မှိုသတ်ဆေး)

သီးနှံ	ကာကွယ်နိုင်နိုင်သော ရောဂါများ	နှုန်းထား (ဂရမ်/ဧက)	ဆေးဖျန်းပြီးနောက် မိုက်သိမ်းရန် စောင့်ဆိုင်းရမည့်ရက်
ပျော်	ရွက်နက်ပြောက် ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်ရောဂါ	၂၅၀ - ၄၂၀	၇ - ၂၀
အာလူး ရောင်းချည်	နောင်းပင်နာကျရောဂါ	၂၅၀ - ၄၂၀	၇ - ၂၀
ပဲမျိုးစုံ	မိုးပြောက်စွန်းရောဂါ	၂၅၀ - ၄၂၀	၇ - ၂၀
ဆေးရွက်ကြီး	ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်ရောဂါ	၂၀၀ - ၃၀၀	၇ - ၂၀
မြေပဲ	သဲရွေးရောဂါ	၄၀၀ - ၈၀၀	၇ - ၂၀

ဆေးဖျန်းပြီး ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ = အနည်းဆုံး (၂၄) နာရီ (သို့မဟုတ်) တစ်ရက်စာရန်ကြိမ် - (၃ - ၄) ကြိမ်  
အစားအစာခြောက်သွေ့ပြီးမှ  
WHO - အဆိပ်ခြိမ်းမှုဆိုင် (U) အဆိပ်ခြိမ်းမှုဆိုင်အတန်း - GHS ၃ (၅)



မှိုသတ်ဆေးကို အသုံးပြုမီ ဆေးအညွှန်းစာကို သေချာဖတ်ပါ။

ပိတ်သောပစ္စည်းများ  
အရွမ်းမိုစည်း - Metiram .... ၇၀% w/w  
အရွမ်းမိုစည်း..... ၃၀% w/w  
စုစုပေါင်း ..... ၁၀၀%

**သုံးစွဲရန်အညွှန်း**  
ရောဂါလက္ခဏာ စတင်ပေါ်ထွက်ပြီး ခြောက်လက်မကျော် ခြောက်လက်မကျော် ခြောက်လက်မကျော် ခြောက်လက်မကျော် (၇-၁၄) ရက်တစ်ကြိမ်စတင်၍ ဖျန်းပါ။

ထောက်ခံထားသော ဆေးနှုန်းထက် မိုပို၍ မသုံးစွဲရ။ မိုပို၍ ဆေးနှုန်းထက် ဆေးနှုန်းထက် ရှိသည့် အရွက်များအား နှစ်ပတ်အောင် ပက်ဖျန်းပါ။

မှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regd No.) ..... 2015-151  
ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ် (SN) ..... 58017055  
ထုတ်လုပ်သည့်ရက် (DOM) ..... 25 July 2017  
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် (Exp.) ..... 24 July 2019

**500g**

