10mm 140mm 70mm 10mm

20mm

250mm

ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင်
လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဖျက်ပိုး	အသုံးပြုပုံနည်းစနစ်	နှုန်းထား (ကီလို/ဧက)
စပါး (တိုက်ရိုက်အစေ့ချနှင့် ပျိုးထောင်စိုက်စနစ်)	ဆစ်ပိုး	မျိုးစေ့ကြဲပက်ပြီး (၂၀–၃၀)ရက်ကြာ (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပြီး (၇–၁၀)ရက်ကြာတွင် ကြဲပက်ရန်၊ ဆေးကြဲပက်ပြီး (၇)ရက်အကြာတွင် ရေကို(၁–၂)လက်မအနက် သွင်းပေးရန်	၃.၈ – ၆.၆
စပါး တိုက်ရိုက်အစေ့ချ	လှေး၊ သရစ်ပိုး	မျိုးစေ့ကြဲပက်ပြီး (၇)ရက်အကြာ၌ ပိုးကောင်ကျရောက်ပါက ကြဲပက်ရန်၊ ဆေးကြဲပက်ပြီး (၇)ရက်အကြာတွင် ရေကို (၁၂)လက်မအနက် သွင်းပေးရန်	၃.၈
အစေ့ထုတ်ပြောင်း	ခေါင်ညွှန့်ထိုးပိုး၊ ပျ၊ ခြ၊ အမြစ်ထိုးပိုး၊ လှေး၊ သရစ်ပိုး၊	စိုက်ကျင်းနေရာ၌ စိုက်နေဆဲ (သို့မဟုတ်) မစိုက်မီ တစ်ရက်ကြို၍ ဆေးတစ်ကြိမ် ကြဲပက်၍ မြေဖုံးအုပ်ပေးရန်	၄–၅.၃
ခရမ်းချဉ်၊ ခရမ်း	ဖိုးလမင်းကျိုင်း၊ ခေါင်ညွှန့်ထိုးပိုး၊ ပိုးနဂါး၊ မြေခွေးပုရစ်၊ ယင်ဖြူ၊ ရွက်ထွင်းပိုး၊ လှေး၊ သရစ်ပိုး	(same as above)	၃–၅
ကြံ	ဖိုးလမင်းကျိုင်း၊ ပင်စည်ထိုးပိုး၊ ခေါင်ညွှန့်ထိုးပိုး	မစိုက်မီ စိုက်မြောင်းအတွင်းသို့ဖြစ်စေ၊ စိုက်ဆဲကာလ၌ဖြစ်စေ ဆေးတစ်ကြိမ် ကြဲပက်ပေးပြီး မြေဖုံးအုပ်ပေးရန်	၄–၁၀

ရီးဂျင့် ၃ ဂျီအာ

ထိသေစားသေပိုးသတ်ဆေး

REGENT® 3 GR

Fipronil 0.3%GR

1 Kg

ပါဝင်သောပစ္စည်းများ

အစွမ်းရှိပစ္စည်း - Fipronil --------------------	၀.၃ %
အစွမ်းမဲ့ပစ္စည်း --------------------------------	၉၉ · ၇၇ %
စုစုပေါင်း --	၁၀၀ %

ထုတ်လုပ်သူ
BASF SE, Ludwigshafen, DE
Carl-Bosch-Str. 38
67056 Ludwigshafen, Germany

ဖြန့်ဖြူးသူ
GOLDEN LION HIGH TECH AGRICULTURAL CO., LTD.
အမှတ် – ၂၄၂၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံ(၂)၊ ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာ
ဖုန်း – +၉၅–၁–၆၈၃၄၅၀၊ ၆၈၃၁၀၃၊ ၆၈၂၆၀၆

ပိုးသတ်ဆေးကို အသုံးမပြုမီ ဆေးအညွှန်းစာကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

BASF
We create chemistry

ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း

ဆေးကို ကိုင်တွယ်သုံးစွဲရာတွင် လက်အိတ်၊ ဖိနပ်၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လက်ရှည်အကျီစသော အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုပါ။
ဆေးကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အစားအစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။
လေကိုဆန်၍ ဆေးကိုမဖျန်းပါနှင့်။ အသုံးပြုပြီးပါက အဝတ်အစားများကို ချွတ်ပစ်ပြီး ဆပ်ပြာ၊ ရေတို့ဖြင့် သန့်စင်အောင် လျှော်ဖွတ်ပါ။
အစားအစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း မပြုလုပ်မီ လက်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးပါ။
ဆေးဖျန်းပြီး အခင်းထဲသို့ ကျွဲ၊ နွားများ မဝင်စေရ။

ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းများ

ဆေးထိသော အရေပြားကို ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့နှင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ မျက်စိထဲဝင်ပါက ရေများများဖြင့် (၁၅)မိနစ်ကြာဆေးကြောပါ။
ဆေးမှုန့်ရှူမိပါက လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော နေရာတွင် ငြိမ်သက်စွာနေပါ။ လိုအပ်ပါက ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းဖြင့် အသက်ရှူစေအောင် ပြုလုပ်ပါ။
မျိုချမိပါက ခံတွင်းကို ဆေးကြောကာ ရေများများ သောက်ပေးပါ။ နီးစပ်ရာ ဆရာဝန်ထံ အမြန်ဆုံးပြသပြီး ကုသမှုခံယူပါ။ **ဆေးကုသမှု** – လူနာ၏ လက္ခဏာပေါ်မူတည်၍ ကုသရပါမည်။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း

အေး၍ ခြောက်သွေ့ကာ လေကောင်းလေသန့် ကောင်းစွာရရှိသောနေရာတွင် ပိတ်ထားသော မူလဘူးပုံစံဖြင့် သိုလှောင်ပါ။ မီး၊ နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ကျရောက်သော နေရာနှင့် ဝေးရာတွင် ထားပါ။ အသုံးပြုပြီးသော ဆေးဘူးခွံများအား ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။ ဖျက်ဆီး၍ မြေမြှုပ်ပစ်ရမည်။ အစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန်စာများနှင့် ဝေးရာတွင် သိုလှောင်ပါ။

သတိပြုရန်

ပုဇွန်ကဲ့သို့သောရေနေသတ္တဝါများကို အဆိပ်သင့်စေပါသည်။ ငါး၊ ပုစွန်နှင့် ဂဏန်းမွေးမြူထားသော ကန်၊ ချောင်း၊ အင်းအိုင်များနှင့် နီးစပ်သောရေပြင်များနှင့် စပါးခင်းများတွင် ဆေးဖျန်းခြင်းမပြုလုပ်ရ။

မှတ်ပုံတင်အမှတ် .(Regd. No.) ....
ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ် (BN) ....
ထုတ်လုပ်သည့်ရက်(DOM) ....
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက် (Exp.) ....
အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း (WHO) ...... CLASS III (အဆိပ်သင့်မှုအသင့်အတင့်ရှိ)

20mm

300mm

P.T. Royalindo Engraftama
ROTOGRAVURE CYLINDER MAKING

Regent 1 Kg

Tanggal	17-03-2016	Revise :	
Customer	Bp. Agustiawan		
Ukuran Design	300mm x 250mm	Ukuran Cylinder :	
No. Job Lama	R200/I/2016	CETAK ATAS	CETAK BAWAH
Operator/designer Rina			

Approved

Marketing | Customer

PERHATIAN ! : KEPADA SEMUA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MOHON PERIKSA SEMUA ASPEK DESIGN INI DENGAN TELITI. KESALAHAN APAPUN YANG TERJADI PADA PROSES SELANJUTNYA BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI LAGI SEKALIPUN TIDAK DIPARAF. TERIMA KASIH.